



\*DT11414\*

## ORDONNANCE TRIPLE THÉRAPIE ANTITHROMBOTIQUE

Poids : \_\_\_\_\_ kg    Taille : \_\_\_\_\_ cm    Allergies : \_\_\_\_\_

Intolérances : \_\_\_\_\_

### 1. Évaluation du risque hémorragique

- Poids inférieur à 60 kg
- Âge supérieur à 75 ans
- Clairance de la créatinine inférieure à 50 ml/min
- Hémorragie récente ou anémie (Hb inférieure à 100)
- Antécédent d'AVC

- AUCUN critère : risque hémorragique bas*
- UN critère : risque hémorragique modéré*
- DEUX critères ou plus : risque hémorragique élevé*

### 2. Prescription de la triple thérapie antithrombotique chez l'utilisateur électif à FAIBLE RISQUE de thrombose de tuteur

- Risque hémorragique BAS

- Anticoagulant\* : \_\_\_\_\_ x 12 mois (puis poursuivre) code : \_\_\_\_\_

OU

- ASA 80 mg die x 3 mois et cesser + clopidogrel 75 mg die x 12 mois et cesser
- Clopidogrel 75 mg die x 3 mois et cesser + ASA 80 mg die x 12 mois et cesser

- Risque hémorragique MODÉRÉ

- Anticoagulant\* : \_\_\_\_\_ x 12 mois (puis poursuivre) code : \_\_\_\_\_

OU

- ASA 80 mg die x 1 mois et cesser + clopidogrel 75 mg die x 6 mois et cesser
- Clopidogrel 75 mg die x 1 mois et cesser + ASA 80 mg die x 6 mois et cesser

- Risque hémorragique ÉLEVÉ

- Anticoagulant\* : \_\_\_\_\_ x 12 mois (puis poursuivre) code : \_\_\_\_\_

OU

- ASA 80 mg die x 6 mois et cesser
- Clopidogrel 75 mg die x 6 mois et cesser

OU

**3. Prescription de la triple thérapie antithrombotique chez l'usager en syndrome coronarien aigu ou électif à HAUT RISQUE de thrombose de tuteur**

Risque hémorragique BAS

- Anticoagulant\* : \_\_\_\_\_ x 12 mois (puis poursuivre) code : \_\_\_\_\_

OU

-  ASA 80 mg die x 6 mois et cesser + clopidogrel 75 mg die x 12 mois et poursuivre

-  Clopidogrel 75 mg die x 6 mois et cesser + ASA 80 mg die x 12 mois et poursuivre

Risque hémorragique MODÉRÉ

- Anticoagulant\* : \_\_\_\_\_ x 12 mois (puis poursuivre) code : \_\_\_\_\_

OU

-  ASA 80 mg die x 3 mois et cesser + clopidogrel 75 mg die x 12 mois et cesser

-  Clopidogrel 75 mg die x 3 mois et cesser + ASA 80 mg die x 12 mois et cesser

Risque hémorragique ÉLEVÉ

- Anticoagulant\* : \_\_\_\_\_ x 12 mois (puis poursuivre) code : \_\_\_\_\_

OU

-  ASA 80 mg die x 1 mois et cesser + clopidogrel 75 mg die x 6 mois et cesser

-  Clopidogrel 75 mg die x 1 mois et cesser + ASA 80 mg die x 6 mois et cesser

\*En l'absence de contre-indication, favoriser un AOD (anticoagulant oral direct, soit apixaban (Éliquis<sup>md</sup>), dabigatran (Pradaxa<sup>md</sup>), édoxaban (Lixiana<sup>md</sup>), ou rivaroxaban (Xarelto<sup>md</sup>)) au lieu de la warfarine.

**4. Initiation d'une protection gastrique**

Pantoprazole 40 mg die

6 mois et cesser.

PP 12

12 mois et cesser.

PP 12

12 mois et poursuivre.

PP 12

Autre IPP \_\_\_\_\_

6 mois et cesser.

PP 12

12 mois et cesser.

PP 12

12 mois et poursuivre.

PP 12

**5. Autres médicaments**

idem

à être prescrits par le centre référent

Nom du prescripteur : \_\_\_\_\_  
En lettres moulées

N° de permis : \_\_\_\_\_

Signature médicale (ou autorisée) : \_\_\_\_\_ Date : 

Année	Mois	Jour	Heure

Télécopié heure : 

Heure

 : \_\_\_\_\_ Initiales : \_\_\_\_\_